

# КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

## 1. Име на лекарствения продукт

ALVOGYL, паста за употреба в стоматологичната практика

## 2. Качествен и количествен състав

LIDOCAINE ..... 5.00 g  
EUGENOL ..... 15.00 g

На 100 g паста за употреба в стоматологичната практика

За помощните вещества, виж раздел 6.1.

## 3. Фармацевтична форма

Паста за употреба в стоматологичната практика.

## 4. Клинични особености

### 4.1. Терапевтични индикации

За допълнителна обработка при алвеолити след ревизиране и почистване на алвеолата.

### 4.2. Дозиране и начин на приложение

#### Само за локално приложение

Малко топче от ALVOGYL трябва да бъде приложено асептично, така че да покрие дъното на алвеолата след ревизирането и почистването. Alvogyl е напълно резорбируем в алвеолата така, че не е необходимо да се отстранява от зъба.

Да не се обработват повече от 5 зъба в едно посещение.

### 4.3. Противопоказания

Алергия към една от съставките от формулата в частност към лидокаина или към локални анестетици.


Алергия към Евгенола.

Да не се прилага при млечни зъби (при деца под 12 години).

### 4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки.

ALVOGYL е нерезорбируем, затова никога не зашивайте след поставяне на продукта.

На пациентите трябва да бъде обяснено, да избягват обилното плакнене на устата в продължение на 24 часа след манипулацията.



Да не се поглъща.

Спортистите трябва да бъдат предупредени, че този лекарствен продукт съдържа активна субстанция, която вероятно ще предизвика позитивна реакция на теста провеждан от антидопинговите контроли.

#### **4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействия**

Няма приложени

#### **4.6. Бременност и кърмене**

Няма приложени

#### **4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма приложени.

#### **4.8. Нежелани ефекти**

Риск от алергия.

#### **4.9. Предозиране**

При нормални условия на употреба в стоматологичната практика, никога не е докладвано за ефекти на предозиране.

### **5. Фармакологични качества**

#### **5.1. Фармакодинамика**

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА В СТОМАТОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА  
(А: храносмилателен тракт и метаболизъм)

Лидокаин: локален анестетик.

Евгенол: антисептик и аналгетик.

Анестетичният ефект трае няколко часа, докато продукта постепенно се резорбира в алвеолата.

#### **5.2. Фармакокинетика**

Няма приложени.

#### **5.3. Предклинични данни за безопасност**

Няма приложени.

### **6. Фармацевтични данни**

#### **6.1. Списък на помощните вещества**

Sodium laurylsulphate, calcium carbonate, penghawar djambi, purified water, natural mint flavour.



## **6.2. Несъвместимости**

Няма приложения

## **6.3. Срок на годност**

2 години.

## **6.4. Специално внимание при съхранението**

Да се съхранява при температура под 25°C.

## **6.5. Естество и съдържание на кутията**

Буркан от млечно стъкло (Туре III) запечатън с полиетиленов obturator с ниска плътност. 12 г буркан.

## **6.6. Инструкции за употреба**

Няма приложения

## **7. Притежател на разрешението за употреба**

### **SEPTODONT**

58, rue du Pont de Creteil  
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  
FRANCE

## **8. Номер на разрешителното**

## **9. Дата на издаване на разрешително/ подновяване на разрешителното**

## **10. Дата на ревизиране на текста**

