

## КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

### 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CEFOX 1g, powder for solution for injection  
ЦЕФОКС 1 g, прах за инжекционен разтвор

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към РУ № 6702	21. 01. 2010
Ср. фрнк. 45 / 14.12.05	

### 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон съдържа 1 g цефотаксим (Cefotaxime) (като натриева сол).  
За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

21. 01. 2010

### 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инжекционен разтвор

### 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

#### 4.1 Терапевтични показания

Цефотаксим се препоръчва за лечение на тежки инфекции, предизвикани от чувствителни към антибиотика бактерии.

- Инфекции на долните дихателни пътища: остръ и хроничен бронхит, бактериална пневмония, белодробен абсцес.
- Инфекции на пикочните пътища: напр. остръ и хроничен пиелонефрит, цистит, асимптомна бактериурия.
- Неусложнена гонорея при пациенти, които са алергични към пеницилин или при наличие на резистентност към пеницилин (произвеждащи пеницилаза щамове на *Neisseria gonorrhoeae*).
- Инфекции в акушерството и гинекологията.
- Инфекции на органите в коремната кухина. напр. перитонит.
- Инфекции на кожата и меките тъкани. напр. инфекции на съединителната тъкан, инфицирани рани.
- Инфекции на костите и ставите: напр. остеомиелит, септичен артрит.
- Менингит
- Септицемия
- Предоперативна профилактика, особено при хирургични интервенции на органи в коремната кухина, храносмилателния тракт, пикочните пътища, при Цезарово сечение, ако съществува риск от бактериална инфекция.

**Внимание!** Преди започване на лечение с цефотаксим, трябва да се изследва чувствителността на бактериите, които предизвикват инфекцията, към лекарствения продукт.

Лечението може да започне преди получаване на резултата от изследването за чувствителност на бактериите към антибиотика. След получаване на резултатите от антибиограмата, може да се наложи промяна на лекарствения продукт, използван за антибактериално лечение.

#### 4.2. Дозировка и начин на приложение

Дозировката зависи от тежестта на инфекцията, чувствителността на микроорганизмите, които причиняват инфекцията, състоянието на пациента, възрастта и телесното



## **Възрастни**

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| – неусложнени инфекции:               | 1 g на всеки 12 часа;   |
| – средно тежки инфекции:              | 2 g на всеки 12 часа;   |
| – тежки инфекции (напр. сепсис)       | 2 g на всеки 6 до 8 часа;   |
| – инфекции, които застрашават живота: | дозата може да се увеличи до 2 g на всеки 4 часа (максимална доза - 12 g на ден);   |
| – неусложнена гонорея:                | 1 g еднократно;   |
| – профилактично преди операция:       | 1 g венозно или мускулно, 90 до 30 мин. преди оперативната интервенция;   |
| – Цезарово сечение:                   | първата доза от 1 g трябва да се приложи възможно най-бързо след стягане на пъпната връв, след което същата доза се поставя венозно или мускулно след 6 или 12 часа |

## **Деца**

Обикновено се използват следните дози:

*Новородени* 50 mg/kg телесно тегло за денонощиye, приложени венозно, разделени на 2 до 4 апликации. При тежки инфекции може да се прилагат дневно 150 до 200 mg/kg телесно тегло за денонощиye, разделени на отделни дози.

*Кърмачета и деца.* 100 до 150 mg/kg телесно тегло за денонощиye, разделени на 2 до 4 апликации. При тежки инфекции дневната доза може да увеличи до 200 mg/kg телесно тегло.

*Деца над 12 годишна възраст* (с телесно тегло над 50 kg): използва се дозировката за възрастни.

## **Дозировка на лекарствения продукт при пациенти с бъбречна недостатъчност:**

Имайки предвид потискането на изльчването на лекарствения продукт и риска от повищаване на плазмените концентрации, дозировката на цефотаксим при болни с бъбречна недостатъчност трябва да бъде съобразена с креатининовия клирънс. Не е отбелязана необходимост от намаляване на дозата при креатининов клирънс по-висок от 20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>. В случай че креатининовият клирънс е по-нисък, дозата трябва да се намали наполовина. Не е необходимо удължаване на интервалите между прилагането на отделните дози.

## **Продължителност на лечението**

Продължителността на лечението зависи от значимостта и вида на инфекцията.

Лекарственияят продукт трябва да се прилага още 2 до 3 дни след отзвучаване на клиничните прояви. При инфекции, предизвикани от β-хемолитични стрептококи от група А, лечението трябва да се провежда най-малко в продължение на 10 дни (профилактика на постстрептококов гломерулонефрит и остръ ревматизъм).

## **Начин на приложение**

### *Интрамускулно приложение*

Препоръчва се дозите над 1 g да се инжектират на две различни места. С оглед намаляване на болката, лекарственияят продукт трябва да се инжектира в големи мускули.

### *Интратенозно приложение*

Този начин на приложение се препоръчва при пациенти с тежки инфекции (сепсис, менингит) и при болни със състояния, които застрашават техния живот.

При интравенозно приложение, лекарственияят продукт трябва да се инжектира бавно, в продължение на 3 до 5 минути, или да се прилага под форма на инфузия в продължение на 20 до 60 минути.



#### 4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към цефотаксим или цефалоспорини.

#### 4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

- Лекарственият продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с алергия към пеницилин и други бета-лактамни антибиотици поради кръстосана алергия. В случай на алергична реакция лечението трябва да се преустанови незабавно. Специално внимание е необходимо при пациенти с алергична диатеза и астма. При тези болни е налице риск от развитие на тежки алергични реакции, включително шок.
- Лекарственият продукт трябва да се прилага внимателно при болни с доказано заболяване на гастроинтестиналния тракт, по-специално колит.
- Прекалено бързото инжектиране на медикамента (за по-малко от 60 секунди), особено в централна вена, може да предизвика поява на животозастращаща аритмия.
- Прилагането на цефалоспорини във високи дози, особено при болни с бъбречна недостатъчност, може да причини разстройства на централната нервна система (конвулсии). Подобни симптоми се наблюдават рядко, предимно при използване на цефалоспорини от I-во поколение, въпреки че понякога може да се отбележат и при използване на цефалоспорини от II или III поколение.
- При продължително приложение, цефотаксим, както и другите антибиотици от цефалоспориновата група, може да предизвика развитие на неутропения, в по-редки случаи на агранулоцитоза, еозинофилия, тромбоцитопения, хемолитична анемия. При провеждане на лечение повече от 10 дни се препоръчва контрол на морфологията и броя на кръвните елементи.
- Лекарственият продукт трябва да се прилага внимателно при болни с бъбречна недостатъчност. В случай че лекарят може да използва само стойностите на креатинина в серума, клирънсът може да се изчисли по следната формула:

$$\text{креатининов клирънс (ml/min)} = \frac{\text{mc. (kg)}^4 (140 - \text{възрастта в години})}{72^4 \text{ стойност на креатинина (mg\%)}}$$

При жени горните стойности трябва да се умножат по 0,85

- В единична доза от 1 g се съдържат 48 mg натрий, което трябва да се има предвид при болни със значително нарушение на водно-електролитния баланс и (или) е важно да се взема под внимание количествата на приетите електролити в дневния баланс.
- В следните случаи не трябва да се прилага разтворен с лидокаин цефотаксим:
  - при интравенозно приложение
  - при деца на възраст до 30 месеца
  - при пациенти, алергични към лидокаин
  - при болни с проводни предсърдни нарушения (това не се отнася за пациенти с имплантиран кардиостимулатор)
  - при пациенти с тежка сърдечна недостатъчност.
- В някои случаи, широкоспектърните антибиотици (напр. макролиди, полисинтетични пеницилени, цефалоспорини) може да предизвикат псевдомемброзен ентерит. Разстройствата на нормално балансираната бактериална флора в червата способства за развитието на *Clostridium difficile* микроорганизми, а техните токсини предизвикват клинични прояви на псевдомемброзен ентерит. По тази причина, пациенти, при които по време на антибиотичното лечение или скоро след неговото приключване е възникнала диария не трябва да провеждат самолечение, а да се обърнат към лекар. При изявени прояви на псевдоентерит е уместно незабавно преустановяване на терапията и провеждане на съответно лечение. При по-леки случаи е достатъчно да се преустанови лечението с продукта, а при по-тежки перорално се прилагат метронидазол или ванкомицин. Противопоказано е използване на лекарствени продукти, които потискат перисталтика.



- Както и при другите широкоспектърни антибиотици продължителното приложение може да доведе до свръхрастеж на нечувствителни организми, вкл. *Candida*. При поява на суперинфекция приложението на Цефокс трябва да се прекрати и да се приложи съответно лечение.

#### **4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие**

- Антибиотиците с бактериостатичен ефект, напр. тетрациклини, еритромицин, хлорамфеникол или сульфонамиди, биха могли да потиснат антибактериалното действие на цефалоспорините, което има особено важно значение при лечение на тежки инфекции.
- Едновременното прилагане на цефотаксим с аминогликозиди, колистин, полимиксини, ванкомицин, фураземид или етакринова киселина, давани във високи дози повишава риска от поява на нефротоксичност.
- При пациенти, третирани с цефотаксим е възможна поява на лъжливо положителни резултати на редукционни тестове за глюкоза в урината.
- Едновременното прилагане с пробенецид води до повишаване на концентрацията на цефотаксим и дезацетилцефотаксим и удължаване на периода на присъствието им в серума.
- При някои пациенти, третирани с цефотаксим се отбелязва фалшиво позитивиране на теста на Кумбс.
- Ефикасността на пероралните контрацептиви може да бъде понижена при едновременно приложение с цефотаксим. Поради това по време на лечение с продукта трябва да се използват допълнителни методи за контрацепция.

#### **4.6. Бременност и кърмене**

Не е доказана безопасната употреба на цефотаксим по време на бременност и кърмене. Не са провеждани контролирани проучвания. Цефотаксим преминава през плацентата и се излъчва в майчиното мляко.

Цефотаксим не трябва да се използва при бременни и кърмещи жени, освен в случай на категорична необходимост.

#### **4.7. Ефекти върху способността за шофиране или работа с машини**

Няма данни относно влиянието на лекарствения продукт върху способността за шофиране или работа с машини.

#### **4.8. Нежелани лекарствени реакции**

При употреба на цефотаксим рядко възникват нежелани лекарствени реакции, които по правило са леки и с преходен характер. Те включват:

- **Сърдечни нарушения:** Много редки (< 1/10 000): при бързо интравенозно инжектиране са отбелязани отделни случаи на аритмия.
- **Нарушения на кръвта и лимфната система:** Редки (> 1/10 000 до < 1/1 000): анемия, левкопения, неутропения, преходна еозинофилия, тромбоцитопения, гранулоцитопения и агранулоцитоза.
- **Нарушения на нервната система:** Редки (> 1/10 000 до < 1/1 000): прилагането на цефотаксим във високи дози, особено при болни с бъбречна недостатъчност, може да причини симптоми на енцефалопатия (напр. нарушения на съзнанието, гърчове).
- **Стомашно-чревни нарушения:** Чести (> 1/1000 до < 1/10): болка в епигастрита, гадене, повръщане, диария.
- Много редки: псевдомемброзен колит
- **Нарушения на бъбреците и пикочните пътища.** редки (> 1/10 000 до < 1/1 000): преходно повишаване на стойностите на уреята и креатинина.
- Много редки (< 1/10 000). интерстициален нефрит.
- **Инфекции и инфекции:** Редки. (> 1/10 000 до < 1/1 000): Продължителната употреба може да доведе до свръхрастеж на нечувствителни микроорганизми (най-често от рода *Candida*)



- **Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:** Чести (> 1/1000 до < 1/10): болка, дразнене, възпаление на кръвоносните съдове на мястото на приложение – в много редки случаи налагат преустановяване прилагането на цефотаксим.
- **Реакции на свръхчувствителност:**  
**Нарушения на имунната система:** В много редки случаи се отбелязват треска, вазомоторен оток, бронхоспазъм, анафилактични реакции.  
**Нарушения на кожата и подкожната тъкан:** Чести (> 1/1000 до < 1/10): обрив, уртикария, сърбеж.  
 Много редки: (< 1/10 000), вкл. изолирани случаи: по-често при болни с астма: ексудативно възпаление на лигавиците синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе, токсична епидермална некролиза.  
 При наличие на някоя от изброените алергични реакции, незабавно трябва да се преустанови приложението на лекарствения продукт
- **Хепато-билиарни нарушения:** Редки (> 1/10 000 до < 1/1 000): преходно повишение на стойностите на билирубина, алкалната фосфатаза и аминотрансферазната активност.

#### 4.9. Предозиране

При предозиране е възможно да възникнат по-силно изразени нежелани ефекти. Възможно е повишаване на риска от дразнене на централната нервна система и появя на гърчове при болни с бъбречна недостатъчност. При предозиране трябва да се преустанови прилагането на лекарствения продукт, да се проследяват основните жизнени функции и, при необходимост, да се проведе адекватно симптоматично лечение.

Лекарственият продукт може да се отстрани от организма посредством хемодиализа или перитонеална диализа.

### 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

#### 5.1. Фармакодинамични свойства

**Фармакотерапевтична група:** антибактериални лекарствени средства за общо приложение;  
 β-лактамни антибиотици; цефалоспорини.

ATC код: J 01 DD 01

Цефотаксим има бактерициден механизъм на действие, който се основава на потискане на биосинтезата на бактериалната клетъчна стена. В резултат на блокиране на активността на транспептидазата, цефотаксим потиска образуването на връзки между пентапептидите на мукополизахарида на бактериалната клетъчна стена. В следващия етап, в резултат на активирането на клетъчните хидролази, бактериалната стена се лизира.

Антибактериалното действие на цефотаксим включва:

#### Грам (+) микроорганизми:

*Staphylococcus aureus* (шамове произвеждащи и непроизвеждащи β-лактамаза), *Staphylococcus epidermidis*, *Enterococcus spp.*, *Streptococcus pyogenes* (група А, β-хемолитичен), *Streptococcus agalactiae* (група В), *Streptococcus pneumoniae*, пеницилин-резистентни *Streptococcus pneumoniae* проявява кръстосана резистентност към цефалоспорини, вкл. и цефотаксим, метицилин-резистентни стафилококи (MRSA) са резистентни към β-лактамните антибиотици, вкл. и към цефотаксим.

#### Грам (-) микроорганизми:

*Citrobacter spp.*, *Enterobacter spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae* (вкл. резистентни към ампицилин шамове), *Haemophilus parainfluenzae*, *Klebsiella spp.*, (също и *Klebsiella pneumoniae*),



*Neisseria gonorrhoeae* (произвеждащи и не-произвеждащи пеницилаза щамове), *Neisseria meningitidis*, *Proteus mirabilis*, *Proteus vulgaris*, *Proteus constans*, *Providencia rettgeri*, , , \*.

\* Много от щамовете, които проявяват полимедикаментозна резистентност са чувствителни към цефотаксим.

#### Анаеробни микроорганизми:

*Bacteroides spp.*, (включително някои щамове *B. fragilis*), *Clostridium spp* (повечето щамове на *C. difficile* са резистентни), *Peptococcus spp*, *Peptostreptococcus spp*, *Fusobacterium spp* (също така *F. nucleatum*)

### 5.2. Фармакокинетични свойства

Цефотаксим не се абсорбира след перорален прием. След интрамускулно и интравенозно приложение бързо се достигат терапевтичните концентрации в серума. След интрамускулно инжектиране на продукта в доза от 500 mg или 1 g, максимална концентрация на цефотаксим в кръвния serum се отчита приблизително след 30 min и достига съответно 11,7 µg/ml и 20,5 µg/ml. След интравенозно приложение на цефотаксим в доза 500 mg, 1 g или 2 g, концентрацията на антибиотика се увеличава пропорционално на дозата, достигайки максимална концентрация съответно 38,9 µg/ml, 101,7 µg/ml и 214,4 µg/ml. Не е установено натрупване на лекарствения продукт в организма. При пациенти с нормална бъбречна функция времето на полуживот на цефотаксим е 1,2 часа, а на дезацетилцефотаксим – 1,6 часа. При пациенти с бъбречна недостатъчност, недоносени деца и новородени с поднормено тегло полуживотът на цефотаксим, както и на неговия метаболит дезацетилцефотаксим се удължава. При болни с тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клиърънс 3-10 ml/min), полуживотът на цефотаксим се увеличава до 2,6 часа, а на дезацетилцефотаксим до 10 часа. Около 40% от приложената доза се свързва с плазмените протеини.

Цефотаксим се метаболизира в черния дроб 1/3 от приложената доза на антибиотика се подлага на биотрансформация до биологичноактивния дезацетилцефотаксим и неактивния лактон. Дезацетилцефотаксим, който е единственият метаболит на цефалоспорините от III поколение, проявява синергизъм с изходното съединение. Дезацетилцефотаксим е с по-малка биоактивност, но е по-устойчив към хидролитичното действие на β-лактамазите, произвеждани от устойчиви щамове, включително анаеробните микроорганизми. При използване на средни дози, се постига инхибиторна концентрация на цефотаксим за повечето чувствителни микроорганизми в много тъкани, органи и телесни течности. Цефотаксим прониква добре в костния мозък, бронхиалния секрет, плеврата, стената на жълчния мехур, перitoneума, перикарда, костите, както и в половите органи и средното ухо. В жълчката се достигат високи концентрации на цефотаксим и на неговия метаболит – дезацетилцефотаксим. При възпалителни процеси прониква в гръбначномозъчната течност, като достига концентрации, достатъчни за потискане на биологичната активност на бактериите, предизвикали инфекцията. Цефотаксим преминава през плацентарната бариера и се изльчва в майчиното мляко. В тъканите и телесните течности дезацетилцефотаксим също достига концентрации, достатъчни за потискане на бактериалния растеж.

Около 80% от приложената доза цефотаксим се изльчва през бъбреците (50 - 60% в непроменена форма), а останалата част с фекалните. Цефотаксим и дезацетилцефотаксим могат да се отстранят посредством хемодиализа или перitoneална диализа.

### 5.3. Предклинични данни за безопасност

При проведени върху опитни животни изследвания, при които са приложени дози, многократно превишаващи средните дози, използвани при хора, не са установени тератогенни ефекти. Цефотаксим не проявява мутагенни свойства, както при теста на Ames, така и при нуклеарния тест.

## 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

### 6.1. Списък на помощните вещества

Няма помощни вещества.



## **6.2. Несъвместимости**

Цефотаксим не трябва да се смесва с аминогликозиди в една спринцовка. Цефотаксим притежава по-висока активност към микроорганизмите в разтвори с pH между 5 и 7. Цефотаксим не трябва да се разтваря с разтворители с pH над 7,5 или с разтвори, съдържащи натриев бикарбонат.

## **6.3. Срок на годност**

2 години.

## **6.4. Специални условия на съхранение.**

Да се съхранява под 25°C. Да се пази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

## **6.5. Данни за опаковката**

Стъклен флакон 20 ml, обезопасен с гумена тапа и алуминиева капачка, съдържащ 1 g от лекарствения продукт, опакован заедно с информационна листовка в картонена кутия.

## **6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа.**

### **Приготвяне на разтвора**

#### *Интрамускулно приложение*

Съдържанието на флакона от 1 g се разтваря в 4 до 10 ml вода за инжекции или 1% лидокайнов разтвор.

Разтворът на цефотаксим с 1% лидокайн трябва да се използва скоро след неговото приготвяне.

**Лидокайниният разтвор може да се инжектира само интрамускулно.**

#### *Интравенозна инжекция*

Съдържанието на флакона от 1 g се разтваря в 10 ml вода за инжекции, 0,9% разтвор на натриев хлорид или 5% глюкозен разтвор.

Цефотаксим не трябва да се смесва с аминогликозиди в една и съща спринцовка.

Полученият разтвор от 1 g цефотаксим и 14 ml вода за инжекции е изотоничен

#### *Интравенозна инфузия*

Цефотаксим може да се прилага под формата на интравенозни инфузии. За приготвянето на инфузионен разтвор, съдържанието на флакона от 1 g се разтваря в 50 до 100 ml физиологичен serum или 5% глюкозен разтвор. Инфузията се провежда за период от 20 до 60 минути.

С оглед правилата за правилно поведение, разтворите трябва да се използват веднага след приготвянето им. Приготвеният с 0,9% разтвор на натриев хлорид цефотаксим остава стабилен при температура от 2° до 8° C (съхранен в хладилник) в продължение на 24 часа, докато този с 5% глюкозен разтвор - до 12 часа, при температура от 2° до 8°C (съхранен в хладилник).

Оцветяването на разтвора от бледожълто до тъмножълто не оказва влияние върху активността или качествата на лекарствения продукт.

## **7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" Joint Stock Company

A. Fleming Street No 2

03 – 176 Warszawa

Полша

## **8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

20040224



**9. ДАТА НА ПЪРВОТО РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ  
ПРОДУКТ**

14.05.2004

**10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА**

Ноември/2009

