

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към РУ	6696
21.01.2010	
Одобрено:	45/14.12.09

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско наименование на лекарствения продукт

Цефзил 250 mg филмирани таблетки

CEFZIL 250 mg film-coated tablets

21.01.2010

2. Качествен и количествен състав

Цефзил 250 mg филмирани таблетки съдържат cefprozil (цефпрозил), еквивалентен на 250 mg безводен цефпрозил.

3. Лекарствена форма

Филмирани таблетки

4. Клинични данни

4.1. Терапевтични показания

Цефзил е показан за лечение на пациенти със следните инфекции, причинени от чувствителни към цефпрозил бактерии.

- Инфекции на горните дихателни пътища, включващи фарингит, тонзилит и синузит
- Инфекции на долните дихателни пътища включващи бронхит и пневмония.
- Неусложнени инфекции на кожата и меките тъкани.
ЗАБЕЛЕЖКА: Абсцесите обикновено изискват хирургичен дренаж.
- Неусложнени инфекции на пикочните пътища, включващи острът цистит.
- Остър среден отит

Необходимо е да се имат предвид официалните препоръки за подходящо използване на антибиотици.

4.2. Дозировка и начин на приложение

Цефзил може да се приема с или без храна. Храната не оказва влияние върху степента на абсорбция.

Препоръчвана дозировка

Възрастни и деца над 12 години

Цефзил се прилага перорално при лечение на инфекции причинени от чувствителни бактерии в следните дози:

Инфекции на горните дихателни пътища

500 mg на 24 часа

Синузит

250 - 500 mg на 12 часа

Инфекции на долните дихателни пътища

500 mg на 12 часа

Неусложнени инфекции на пикочните пътища


500 mg на 24 часа

Инфекции на кожата и меките тъкани

250 mg на 12 часа или

500 mg на 24 часа

Бъбречно нарушение:



Цефпрозил може да се прилага при болни с увредена бъбречна функция. Не е необходима дозова корекция при стойности на креатининовия клирънс $> 30 \text{ ml/min}$. При болни с креатининов клирънс $< 30 \text{ ml/min}$, след приложение на първата стандартна доза, 50% от следващата стандартна доза се дава в нормалните дозови интервали. Цефпрозил се отстранява частично чрез хемодиализа; поради това се прилага след приключване на хемодиализата.

Чернодробно нарушение:

Не се изисква дозова корекция при болни с увредена чернодробна функция.

Деца и подрастващи

В клинични проучвания, Цефзил е прилаган на педиатрични пациенти, които са били на възраст най-малко 6 месеца.

Цефзил таблетки не е подходящ за употреба при деца. При деца трябва да се използва Цефзил перорална суспензия.

При среден отит, препоръчваната доза Цефзил е 15 mg/kg , прилагана на всеки 12 часа.

При инфекции на горните дихателни пътища, фарингит или тонзилит, препоръчваната доза Цефзил е 20 mg/kg веднъж дневно или 15 mg/kg/ден , разделена на две равни дози. При синузит, препоръчваната доза е $7,5 \text{ mg/kg}$ до 15 mg/kg , прилагана на всеки 12 часа.

При неусложнени инфекции на кожата и кожните структури се препоръчват 20 mg/kg веднъж дневно.

Максималната детска дневна доза не трябва да надвишава максималната препоръчана дневна доза при възрастни. При лечение на β -хемолитични стрептококови инфекции, терапевтични дози Цефзил се прилагат за 10 дни. Безопасността и ефективността при деца под 6 месеца не е установена.

4.3. Противопоказания

Цефзил е противопоказан при болни със свръхчувствителност към активната съставка или към някое от помощните вещества. Освен това е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към антибиотици от класа на цефалоспорините.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Преди започване на терапия с Цефзил е необходимо внимателно разпитване на болния за предхождащи реакции на свръччувствителност към цефалоспорини, пеницилини или други лекарства.

Ако този антибиотик се приложи на пеницилин-чувствителни пациенти, необходимо е внимание поради кръстосана чувствителност между бета-лактамните антибиотици, която е добре документирана и се наблюдава при 10% от болните с данни за пеницилинова алергия. Ако настъпи алергична



реакция към Цефзил, лечението се прекъсва. Тежки остри реакции на свръхчувствителност изискват специално лечение.

Общата дневна доза Цефзил трябва да се намали при болни с тежка бъбречна дисфункция (креатининов клирънс ≤ 30 ml/min) поради високите и/или продължителни плазмени концентрации на антибиотика в сравнение с нормалните стойности. Цефалоспорините, в това число Цефзил, трябва да се прилагат с внимание при болни, получаващи съпътстващо лечение с мощни диуретици, тъй като се подозира, че тези вещества влошават бъбречната функция.

Продължителното използване на Цефзил може да доведе до развитие на резистентни бактериални щамове. Особено важно е болния да бъде под наблюдение. Ако по време на лечението настъпи суперинфекција, трябва да се вземат съответните мерки.

Докладван е положителен директен тест на Coombs по време на лечение с цефалоспоринови антибиотици.

Предупреждения и предпазни мерки за лекарствения клас

Диария, свързана с *Clostridium difficile* (CDAD), е докладвана при употребата на почти всички антибактериални средства, включително и Цефзил, и може да варира по сериозност от лека диария до фатален колит. CDAD трябва да се обсъди при всички пациенти, които развиват диария вследствие на употреба на антибиотици. Необходимо е внимателното снемане на анамнеза, тъй като е докладвана поява на CDAD повече от два месеца след приложението на антибактериални средства. Ако CDAD се подозира или се потвърди, може да се наложи прекратяване на едновременна употреба на антибиотици, които не са насочени срещу *C. difficile*.

Педиатрична употреба

Не са установени безопасността и ефективността при педиатрични пациенти на възраст под 6 месеца.

4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ефекти на други лекарства върху цефпрозил

Докладвана е нефротоксичност след едновременно прилагане на аминогликозидни антибиотици и цефалоспоринови антибиотици.

Едновременно прилагане на пробенецид удвоjava площта под кривата (AUC) за цефпрозил.

Взаимодействия с лекарства/лабораторни изследвания

Цефалоспориновите антибиотици могат да доведат до фалшиво положителни реакции за глюкоза в урината с меден редуктазен тест (Benedict или Fehling разтвори или с Clinitest таблетки), но не и с ензимен тест за глюкозурия (глюкозооксидазен тест). Фалшиво отрицателна реакция може да се наблюдава при ферицианидния тест за глюкоза в кръвта. Наличието на цефпрозил в кръвта не води до взаимодействие с метода за изследване на креатинин в плазма и урина с алкален пикрат.



Както и при други цефалоспорини, ефикасността на пероралните контрацептиви може да бъде понижена при едновременно приложение с Цефзил. По време на лечение с Цефзил трябва да се вземат допълнителни мерки за контрацепция.

4.6. Бременност и кърмене

Няма данни за увреждане на фетуса от цефпрозил моногидрат при проучвания на репродуктивността, проведени при зайци, мишки и плъхове в дози съответно 0,8, 8,5 и 18,5 пъти максималните дневни дози при хора (1000 mg), основани на телесна повърхност (mg/m^2). Обаче не са провеждани адекватни и добре-контролирани проучвания при бременни жени. Поради това, че проучванията при животни не са показателни за хората, това лекарство трябва да се използва по време на бременност, само ако ясно и точно е определена нуждата от него.

По-малко от 0,3% от дозата, приложена на майка кърмачка, се екскретира в кърмата. Необходимо е повишено внимание, когато Цефзил се прилага в период на кърмене.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини


Не са провеждани проучвания на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Нежеланите лекарствени реакции при цефпрозил за подобни на онези, наблюдавани при други цефалоспорини за перорално приложение. Цефпрозил обикновено се понася добре при контролирани клинични изпитвания. Приблизително 2% от пациентите преустановяват лечение с цефпрозил заради нежелани лекарствени реакции.

Таблицата по-долу включва всички нежелани лекарствени реакции, както са описани към момента в CCDS. Списъкът е представен по системо-органни класове, MedDRA терминология и честота, като са използвани следните категории: много чести ($\geq 1/10$), чести ($\geq 1/100, < 1/10$), нечести ($\geq 1/1000, < 1/100$), редки ($\geq 1/10000, < 1/1000$), много редки ($< 1/10000$) и с неизвестна честота (не може да бъде изчислена от наличните данни). Таблицата е съставена според препоръките на CIOMS работна група III и V и Указанията на Европейската комисия за Кратката характеристика на продукта.

Системо-органни класове	Честота	MedDRA термин
Инфекции и инфестации	Чести	Суперинфекци и вагинална инфекция
Нарушения на кръвта и лимфната система	Чести	Еозинифилия
	Нечести	Намален брой на белите кръвни клетки
	Редки	Тромбоцитопения и удължено протромбиново време
Нарушения на имунната система	Редки	Ангиоедем; анафилактична реакция и серумна болест



Нарушения на нервната система	Чести	Световъртеж
	Нечести	Състояние на объркане, безсъние, сомнолентност, психомоторна хиперактивност, нервност и главоболие
Стомашно-чревни нарушения	Чести	Болка в корема, диария, гадене, и повръщане
	Редки	Колит и псевдомембранозен колит
	Неизвестна	Промяна в цвета на зъбите
Хепато-билиарни нарушения	Чести	Повишен аспартат аминотрансфераза и повищена аланин аминотрансфераза
	Нечести	Повишен в кръвта алкална фосфатаза
	Редки	Холестатична жълтеница и повишен билирубин в кръвта
Нарушения на кожата и подкожната тъкан	Чести	Дерматит
	Нечести	Обрив и уртикария
	Редки	Синдром на Stevens-Johnson, еритема мултиформе и генитален пруритус
Нарушения на бъбреците и никочните пътища	Нечести	Повишен уреа в кръвта и повишен креатинин в кръвта
Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение	Редки	Пирексия

4.9. Предозиране

Единични дози, от порядъка на 5000 mg/kg, прилагани върху животни в проучванията за токсичност, нямат сериозни или летални последствия.

Цефпразил се елиминира главно през бъбреците. При случаи на предозиране, особено при пациенти с нарушена бъбречная функция, хемодиализата подпомага отстраняването на цефпразил от организма.

5. Фармакологични свойства

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: второ поколение цефалоспорини, ATC: J01DC10.

Микробиология

Цефпразил има *in vitro* активност срещу широк спектър от грамположителни и грамотрицателни бактерии. Бактерицидната активност на цефпразил е резултат от инхибирането на синтеза на клетъчната стена. Цефпразил е активен срещу повечето щамове на следните микроорганизми *in vitro*:

Аероби, грамположителни микроорганизми:



- Стапилококи, вкл. *Staphylococcus aureus* (вкл. пеницилазо-продуциращи щамове); *S. epidermidis*; *S. saprophyticus*; *S. warnei*. (Заб. цефпрозил не е активен срещу метицилин-резистентни щамове стапилококи);
- Стрептококки, вкл. *Streptococcus pyogenes* (стрептококки група А); *S. agalactiae* (стрептококки група Б); *S. pneumoniae* (вкл. повечето интермедиерни пеницилин-резистентни щамове с пеницилин MIC от 0,1 до 1 µg/ml); Групи С, D, F & G стрептококки; стрептококки от група Viridans;
- *Enterococcus durans*; *E. faecalis*; (заб: цефпрозил е неактивен срещу *E. faecium*);
- Други: *Listeria monocytogenes*.

Аероби, грамотрицателни микроорганизми:

- *Moraxella catarrhalis* (вкл. β-лактамазо продуциращи щамове);
- *Hemophilus influenzae* (вкл. β-лактамазо продуциращи щамове);
- *Citrobacter diversus*;
- *Escherichia coli*;
- *Klebsiella pneumoniae*;
- *Neisseria gonorrhoeae* (вкл. пеницилаза- продуциращи щамове);
- *Proteus mirabilis*;
- *Salmonella* sp.;
- *Shigella* sp.;
- *Vibrio* sp. (Заб. Цефпрозил не е активен срещу повечето щамове на *Acinetobacter*, *Enterobacter*, *Morganella morganii*, *Proteus vulgaris*, *Providencia*, *Pseudomonas* и *Serratia*.)

Анаеробни микроорганизми:

Заб.: Повечето щамове от *Bacteroides fragilis* са резистентни на цефпрозил.

- *Clostridium difficile*; *C. perfringens*
- *Fusobacterium* sp.;
- *Peptostreptococcus* sp.;
- *Prevotella melanogenica* (познат като *Bacteroides melaninogenicus*)
- *Propionibacterium acnes*.


Тестове за чувствителност

Количествени методи, които изискват измерване на диаметрите на зоната, дават най-точна оценка за чувствителността на бактериите към антимикробните средства. Интерпретацията включва корелация на диаметъра, получен от диск тестовете, с минималната инхибиторна концентрация (MIC) за цефпрозил.

Дисковете за тестване на чувствителност към цефалоспорини (цефалотин дисковете) не са подходящи поради разлики в спектъра с цефпрозил. 30-µg цефпрозил дискове се използват за тестове на изолати *in vitro*.

Резултатите от лабораторните тестове от стандартен тест за чувствителност с един диск с 30-µg цефпрозил диск трябва да се интерпретират според следните критерии:

Диаметър на зоната (mm)	Интерпретации	MIC-корелация
≥18	(S) чувствителен	≤8 µg/ml
15-17	(MS) умерено чувствителен	16 µg/ml



≤ 14	(R) резистентен	$\geq 32 \mu\text{g/ml}$
-----------	-----------------	--------------------------

Резултат „чувствителен“ показва, че патогенът вероятно ще бъде инхибиран от обикновено постижими кръвни концентрации. Резултат „умерено чувствителен“ показва, че организъмът ще бъде чувствителен, ако се използва висока доза или ако инфекцията е ограничена до тъкани и течности (напр. урина), в които се постигат високи антибиотични нива. Резултат „резистентен“ показва, че постижимата концентрация на антибиотика вероятно няма да бъде инхибиторна.

Стандартизираните процедури изискват използването на лабораторни контролни организми.

5.2. Фармакокинетични свойства

Цефзил се резорбира добре след перорално приложение при приемане преди или по време на хранене. Пероралната бионаличност е приблизително 90%. Фармакокинетиката на цефпрозил не се променя от приложение с храна или антиациди. Средните плазмени концентрации след приложение на цефпрозил на гладно са представени в таблицата по-долу. Концентрациите в урината са около 60% от приложената доза.

Доза	Средни плазмени концентрации на цефпрозил*			Уринна екскреция (8 часа)
	Връх (~1,5 часа)	4 часа	8 часа	
250 mg	6,1	1,7	0,2	60%
500 mg	10,5	3,2	0,4	62%
1000 mg (1 g)	18,3	8,4	1,0	54%

*Данните представляват стойностите на средните плазмени концентрации от 12 здрави доброволци. Фармакокинетичните данни са взети от лекарствена форма капсули; доказана е, обаче, биоеквивалентността на перорален разтвор, капсули, таблетки и перорална суспензия.

По време на първия 4-часов период след прилагане на лекарството, средните концентрации в урината след прилагане на дози от 250 mg, 500 mg и 1 g са приблизително 170 $\mu\text{g/ml}$, 450 $\mu\text{g/ml}$ и 600 $\mu\text{g/ml}$ съответно.

Свързването с плазмените протеини е около 36% и е независимо от концентрациите в диапазона от 2 $\mu\text{g/ml}$ до 20 $\mu\text{g/ml}$. Средният плазмен полуживот при нормални индивиди е приблизително 1,3 часа.

Пиковите концентрации на цефпрозил в кожната мехурна течност са 3,0 и 5,8 $\mu\text{g/ml}$ при пациенти, получаващи една доза от съответно 250 mg или 500 mg цефпрозил. Полуживотът в кожната мехурна течност (2,3 часа) е по-дълъг от този, наблюдаван в плазмата.

След приложението на една доза от 15 или 20 mg/kg при пациенти с хроничен среден отит, концентрациите на цефпрозил в течността в средното ухо варира от 0,06 до 8,7 $\mu\text{g/ml}$. Концентрациите на цефпрозил в течността в средното ухо остават над MIC за повечето широко разпространени бактерии, свързани със среден отит, за повече от 6 часа след прилагане на цефпрозил.



Няма данни за акумулиране на цефпрозил в плазмата на индивиди с нормална бъбречна функция след многократно приложение на перорални дози до 1 g на 8 часа за 10 дни.

Бъбречно увреждане

При болни с намалена бъбречна функция, удължаването на плазмения полуживот е свързано със степента на бъбречната дисфункция. При болни с пълна липса на бъбречна функция, плазменият полуживот на цефпрозил може да бъде и 5,9 часа. Полуживотът се скъсява чрез хемодиализа до 2,1 часа. Не са установени пътища на екскреция при пациенти със значително увредена бъбречна функция (вж. т. 4.2 и 4.4).

Чернодробно увреждане

При болни с увредена чернодробна функция няма статистически значими разлики във фармакодинамичните параметри, когато се сравняват с тези при нормални контролни индивиди.

Гериатрични пациенти

Средната AUC, наблюдавана при пациенти в напреднала възраст на 65 години и повече, е около 35-60% по-висока от това при по-млади индивиди. Значението на тези зависимости от възрастта вариации във фармакокинетиката на цефпрозил не са достатъчни за да изискват корекция в дозовите режими.

Педиатрични пациенти и подрастващи

След приложение на еднократни дози от 7,5 mg/kg или 20 mg/kg на педиатрични пациенти, концентрациите на цефпрозил варират от 0,5 до 4,3 µg/g в тонзилите и варират от 0,4 µg/g до 4,9 µg/g в аденоидната тъкан. Концентрациите в тонзилите и аденоидната тъкан повече от 3,2 часа след дозиране са по-високи от минималните инхибиторни концентрации (MIC) за широко разпространени патогени, които причиняват фарингит или тонзилит.

Фармакокинетиката на цефпрозил е сравнима между деца (на възраст от 6 месеца до 12 години) и възрастни. Плазмените концентрации при деца, получаващи 7,5 до 30 mg/kg цефпрозил са сравними с тези, наблюдавани при възрастни пациенти, получаващи перорално 250-1000 mg. C_{max} се достига 1 до 2 часа след приложението и полуживотът е 1,5 часа.

Пол

Средната AUC, наблюдавана при жени е приблизително 15-20% по-висока от тази при мъже. Значението на тези зависимости от пола вариации във фармакокинетиката на цефпрозил не са достатъчни, за да изискват корекция в дозовите режими.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Не е наблюдаван мутагенен потенциал на цефпрозил в съответните прокариотни или еукариотни клетки *in vitro* или *in vivo*. Не са провеждани дългосрочни проучвания *in vivo* за оценяване на канцерогенния потенциал.



Проучванията за репродуктивност не показват увреждане на фертилитета при животни.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества

микрокристална целулоза
натриев нищестен гликолат
магнезиев стеарат
antifoam C емулсия
оранжево багрило Opadry YS-1-2546

6.2. Несъвместимости

Неприложимо.

6.3. Срок на годност

3 години

6.4. Специални условия за съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен и пазете съдържанието от влага. Да се съхранява при стайна температура (под 30°C). Да не се използва след изтичането на срока на годност, отпечатан върху опаковката.

6.5. Данни за опаковката

Цефзил 250 mg филмирани таблетки: блистер с 20 филмирани таблетки.

6.6. Инструкции за употреба

Няма специални инструкции.

7. Притежател на разрешението за употреба

Bristol-Myers Squibb Kft; Szatadsag ter 7;
1054 Budapest, Унгария

8. Номер на разрешението за употреба

9800340

9. Дата на подновяване на разрешението за употреба

03/08/2004

10. Дата на актуализиране на текста

12/2009

